

FLUCLOXACILLINE
ANTISTAPH®

FORMES ET PRÉSENTATIONS :

- Gélules à 500 mg - Boîtes de 12 et 24;
- Poudres pour suspension orale à 125 mg/5 ml et 250 mg/5 ml - Flacons de 100 ml.

COMPOSITION :

Gélules: Flucloxacilline DCI (sous forme de sel sodique) 500 mg - Excipients q.s.p. 1 gélule, - *Poudre pour suspension orale 125 mg / 5 ml:* Flucloxacilline DCI (sous forme de sel sodique) 3,96 g - Excipients q.s.p. 100 g, - *Poudre pour suspension orale 250 mg / 5 ml :* Flucloxacilline DCI (sous forme de sel sodique) 7,93 g - Excipients q.s.p. 100 g - Flacons de 100 ml. **PROPRIÉTÉS:** La flucloxacilline est un antibiotique de la famille des bêta-lactamines du groupe des pénicillines isoxazoles semi-synthétiques. Résistante à la pénicillinase staphylococcique ainsi qu'à l'acidité gastrique, la flucloxacilline est bactéricide. Elle agit au niveau de la synthèse de la paroi bactérienne. Spectre d'activité: c'est avant tout un antistaphylococcique actif sur staphylococcus auréus (y compris les souches productrices des bêta-lactamases) staphylococcus épidermitis, streptocoques pyogènes, streptococcus pneumonie, S. Viridans, clostridium spp, bacillus anthracis, neisseria spp.

INDICATIONS :

ANTISTAPH® est indiqué particulièrement dans les:

- Infections de la peau et des tissus mous: furoncle; abcès; folliculites; cellulites; conditions favorisant les infections de la peau (ex : ulcère, eczéma, acné, brûlures infectées, impétigo, otite moyenne et externe).
- Infections du tractus respiratoire: pneumonie; abcès pulmonaire; sinusite; pharyngite; angine; amygdalite.
- Autres infections causées par des organismes flucloxacilline-sensibles: ostéomyélite; entérite; endocardite; infection du tractus urinaire; méningite; septicémie.
- A haut risque staphylococcique,

ANTISTAPH® peut-être utilisé en traitement préventif de courte durée (chirurgie cardiothoracique et orthopédique).

CONTRE-INDICATIONS : - Allergie aux antibiotiques du groupe des bêta-lactamines (ex: pénicillines, céphalosporines). - Antécédents d'ictère et de dysfonctionnement hépatique.

PRÉCAUTIONS: Grossesse:

Bien que les études effectuées sur plusieurs espèces animales n'aient pas montré d'action tératogène ou foetotoxique, la flucloxacilline doit être utilisée avec précaution chez la femme enceinte.

Allaitement: La flucloxacilline passant dans le lait maternel, l'éventualité d'une suspension de l'allaitement doit être envisagée. **ANTISTAPH® est un médicament : ne pas laisser à la portée des enfants. En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**

EFFETS INDÉSIRABLES :

- **Manifestations allergiques** : érythème; urticaire; rhinite; éruption cutanée morbiforme; rarement choc anaphylactique. - **Troubles digestifs**: nausées; vomissements; diarrhées; rarement colite pseudo-membraneuse.

POSOLOGIE : Selon prescription du médecin. En moyenne:

Infections modérées : - Adultes: 500 mg 2 à 3 fois par jour ou 25 à 50 mg/kg/jour en 2 à 3 prises. - Enfants/Nourrissons: 250 mg 2 à 3 fois par jour ou 25 à 50 mg/kg/jour en 2 à 3 prises. - Nouveau-nés: 125 mg 2 à 3 fois par jour ou 25 à 50 mg/kg/jour en 2 ou 3 prises.

Infections sévères : - Adultes

: 100 mg/kg/jour jusqu'à 8 g par jour en 4 à 6 prises. - Enfants/Nourrissons: 50 à 100 mg/kg/jour en 4 à 6 prises. – Nouveaunés : jusqu'à 50 mg/kg/jour en 4 à 6 prises.

MODE D'EMPLOI ET D'ADMINISTRATION :

Les gélules et les sirops seront pris de préférence une heure avant les repas. - *Poudre pour suspension orale*: Remplir le flacon jusqu'au trait avec de l'eau minérale non gazeuse ou de l'eau bouillie refroidie. Agiter le flacon à plusieurs reprises et avant chaque usage.

CONSERVATION :

Les gélules doivent être conservées à une température inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité. La suspension reconstituée doit être conservée au réfrigérateur à température inférieure ou égale à 4°C, et utilisée dans les 8 jours. **Liste I.**